

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2021

OBJETIVO

Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de Influenza en la población de riesgo en Argentina.

GRUPOS DE POBLACIÓN DIANA DE VACUNACIÓN

1. Personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años de edad. Se hará especial énfasis en aquellas personas que conviven en instituciones cerradas.
2. Personas con menos de 65 años de edad que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe

Ahora más que nunca es importante vacunarse contra la influenza durante la temporada 2020-2021 debido a la pandemia del COVID-19 en curso. Vacunarse contra la influenza es particularmente importante para los adultos de 65 años de edad o más, quienes representan la mayor parte de las hospitalizaciones y muertes a causa de la influenza y del COVID-19.

AGENTES INMUNIZANTES -

VACUNAS DISPONIBLES

Viraflu®: una dosis de
0,5 mL (vacuna
trivalente:
TIV)

Fluxvir®: una dosis de
0,5 mL (vacuna
trivalente
adyuvantada: aTIV)



Virafllu®

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria)

Fluxvir®

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria)
MF59C.1 (mejor respuesta >65 años)

Fluxvir®

Un coadyuvante es un ingrediente que se agrega a una vacuna para generar una respuesta inmunitaria más fuerte a la vacunación.

El MF59 es una emulsión de aceite escualeno del tipo aceite en agua. El escualeno, una sustancia natural, se somete a un riguroso proceso de purificación antes de llegar a la fabricación de las vacunas. La vacuna Fluxvir® está aprobada para ser utilizada en personas de 65 años de edad en adelante que a menudo presentan una respuesta inmunitaria de protección inferior luego de la vacunación contra la gripe en comparación con personas más jóvenes y saludables.

Población objetivo	Acciones
Personal de salud / estratégico	Aplicar una dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal. En menores de 65 años se utiliza Viraflu y en ≥ 65 años preferentemente Fluxvir.
Embarazadas	Aplicar una dosis de 0,5 mL de Viraflu® en cualquier momento de la gestación.
Púerperas	Aplicar una dosis de 0,5 mL de Viraflu® Hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo.
Niños y niñas de 6 a 24 meses inclusive*	Aplicar dos dosis de 0,25 mL de vacuna antigripal Viraflu pediátrica® separadas por un mes
Niños y niñas de 25 a 35 meses inclusive con factores de riesgo*	Los niños que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente deberán recibir solo una dosis.
Niños y niñas mayores de 36 meses a 8 años inclusive, con factores de riesgo*	Aplicar dos dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal Viraflu®. Los niños que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente deberán recibir solo una dosis.
Niños y adultos de 9 años a 64 años inclusive con factores de riesgo	Aplicar una dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal Viraflu®
Adultos mayores o igual de 65 años	Aplicar una dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal, preferentemente adyuvantada - Fluxvir®

INDICACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LOS VACUNADOS COVID

Al momento de la realización del presente documento, la coadministración de las vacunas contra la COVID-19 con otras vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada. Por este motivo, y hasta tanto se tenga más información al respecto, se recomienda respetar un intervalo de 14 días con la aplicación de otras vacunas, incluida la vacuna antigripal.

En el caso de haberse aplicado simultáneamente con la vacuna contra COVID- 19 o con un intervalo menor a 14 días, deberá realizarse la notificación correspondiente del ESAVI, y no está indicado aplicar nuevamente ninguna de las vacunas administradas

INDICACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LOS VACUNANADOS COVID

- Considerar que la vacunación antigripal debe estar separada por 14 días de cualquier vacuna contra la COVID. En el caso de COVISHIELD (intervalo de 8 a 12 semanas) se puede aplicar vacuna antigripal entre la primera y segunda dosis.

VACUNACIÓN EN PACIENTES CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19

Si bien no existen contraindicaciones médicas para administrar vacunas (incluida vacuna antigripal) en pacientes con diagnóstico de COVID-19, se recomienda posponer la vacunación con el objetivo de evitar la transmisión viral y propagación de la enfermedad, en las siguientes situaciones:

- **CASOS CONFIRMADOS:** vacunar luego de 14 días de la fecha de inicio de los síntomas o bien hasta la recuperación clínica.
- **CONTACTOS DE CASOS CONFIRMADOS:** vacunar luego de completar los 14 días de aislamiento

INDICACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LAS VACUNAS ANTIGRI PALES

- Conservación de 2° a 8° (en heladera tradicional),
- Protegida de la luz
- No se congela
- Se transporta con geles refrigerantes, en contenedores adecuados

